□內政部登記證警字第一一二七號□　□本報特聘請吳之屏方家楨大律師爲常年法律顧問□

長壽

于右任

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

每份 第一三八期 四分

中華民國廿四年一月廿五日

每逢星期五出版全年五十期連郵二元國外加倍

館址 上海三馬路雲南路口幸福書局內

□本期目錄□

疲倦與休息
全身病與精蟲缺乏之關係
薄荷葉消散乳腫
梅毒之害
活屋(三十二)
白參及紅參調製法
男子淋病自己注射法
脫陽暴亡之研究
疔瘡證治
不孕之原因
黃　之病理及治療
口腔之衛生
名醫大麻金子久醫案
低能兒之精神衛生
便閉之原因與治療法

□愛情障碍

愛香惡臭……人之恒情
鼻流濁涕……腥臭異常
愛情破產……理所必然
挽救之策……其惟保腦

程君青心爲本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常，其夫人情春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心繫憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見長壽報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

疲倦與休息

陳果夫

人的活動。無論屬於體力或精神部份。倘長久繼續行使定要感到疲倦。還得要發生不快的情感。而注意力也因此分散。工作的效率也因此減低，這就是疲勞的現象。不過想知道疲勞的程度不能以主觀的疲倦感覺爲標準。還要依客觀的特徵來測定。譬如在工作的前後用量力表來測驗比較其力的分量。便能知道因工作而起疲倦程度。或者以感覺的識別來辨別感覺的變化。而測定其疲勞的程度。至於測定兒童的疲勞性又當因其年齡以示差別。當小孩初生最易疲勞。所以休息的時間應特別加長。後來漸漸把休息時間縮短。用力用腦的時間增加。工作的能力也因此增加所以工作時間和休息時間。是因年齡的增加成比例的變化。如果不合平衡的狀態。就難免會因疲勞過度而損害康健。據各專家的報告。兒童睡眠的時間。七歲至十三歲還要十個鐘頭以上。年紀過了壯年。照理應該與小孩不同。漸漸的使他工作的時間加長。但是在童年以至成人之間。工作的能力雖然漸漸增加。因各種生理機能正在發。所以使用其腦力或體力。應有謹慎的限制。而用腦方面更與用力有別。因爲腦是一身的總樞。其組織和實素。爲人體中最精微的部份。很容易損傷。一有損傷。更影響於智慧和神經機能。使發育受其阻礙。所以在成年以前腦的發育不甚強固。用腦的工作。更應極端留意節制。反過來說。就是年老的也應該如此。腦的休息。應當比其他身體各部份的休息更爲重要。

朱振聲醫士

上海新新公司常年醫藥顧問
上海世界書局常年醫藥顧問

診例

(甲)門診一元　號金不取
(乙)出診四元　路遠遞加
(丙)膏丸方四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止出診四時以後

電話九一四九二

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

號廬啓

白參及紅參調製法

㊀白參。人參出土時。外色灰黑。取竹彎弓。擴以絃綫。鋸去黑膚(揎皮)之大半。內皮部尙富於乳白汁。味極苦。故須調製而後可用。其法。選取整個之人參。勿去鬚部。(若新鮮時去其參鬚。則中含之乳白汁外溢矣。)連同建冰(福建冰糖)投入沸水之釜。約在四五分鐘。煮至半黃色。速即取之(煮至過度則原味淡而變紅。於是裝入高四寸。長二尺。闊尺半之木匣中。匣以玻璃爲蓋。匣之板底。穿孔通氣。復鋪竹簾於其上。簾上置參。暴於日光以乾燥爲度。暴乾後成淡黃色。可貯藏於密閉之生石灰缸中。則自然永久而不敗壞。所謂糖白抄參微糖白抄參等。皆用此法製成之。又市上所售之參糖。即調製本參時所得之副產物也。

㊁紅參。國產紅參如石柱參等。大抵採用朝鮮之製法者也。朝鮮紅參之製法大要。即將秋季採掘之根莖。丁寧洗滌。除去土砂等之附着物。以一二日曝乾之後。即行蒸氣法。其供用之釜。普通口徑一尺六寸。底徑二尺三寸。深一尺。釜上加陶製之甑。口徑二尺一寸。高一尺八寸。底徑一尺七寸。底部有多數之孔。甑中架以樹枝。排列人參於其上。閉蓋而蒸。其初加水於釜。漸次加熱至煮沸。沸騰後之火力。務必維持其原狀。以一時半至二時爲度。此際其沸騰之湯。若直接接觸其根。則製品變爲黑棕色。而其品質遂不免遜色。因之釜湯與根莖之間。須加布一層。可以防之。或不取樹枝。改用蒸籠密閉蒸煮。蒸至適當之時。攤於簸席上。冷却之後。置焙爐上。以四五日焙乾。則得美麗之紅參。朝鮮人參以紅者爲貴。國產吉林人參適相反。以白者爲貴。紅者次之。

生曬人參不加調製。即將出土之參。不去揎皮之鬚根。再三洗刷。去淨泥土。繫以長綫。縣於空中而暴乾。色灰而微黃色是也。

男子淋病自己注射法(上)

謝筠壽

淋病是一種慢性的疾病。病人往往因爲經濟和時間的關係。不能天天請醫生繼續治療。但是局部洗滌。又是很重要的事情。所以病人常常請求醫生要自己注射。或是醫生因爲病人難以繼續求醫的關係。也有吽病人自家去注射的。但是自己注射。倘使沒有相當的注意。不但沒有功效。而且容易引起種種不良的影響。現在吾把自己注射應當的地方。逐條的解說在下面。

淋病最急性的時期。尿道口腫脹。包皮浮腫。在這個時候。最好不要注射。常有因此使病勢增惡。或者竟發生急性後尿道炎和睪丸炎等的危險。所以最好等待急性症候經過些。開始注射。

二・注射的時候。先要放尿。就是想把尿道裏面的分泌物。充分洗滌清淨。然後方才可以把藥液注射進去。否則有把前尿道的汚物送入到尿道的危險。

三・注射的時候。應當緩徐消入。萬不迅速地注射進去。這是應當嚴禁的。

四・注射的分量。開始注射的時候。應當從少量起首。普通的尿道容積。大約是十至十二公分。所以普通的注射器。是十至十五公分。但是尿道發炎的時候。尿道腫脹狹小。難以容留這許多溶液。並且因爲各人的尿道。大小不同。所以注射量在起初的時候。大約是五、六公分。照第三條所講。緩徐地注射進去。倘是炎性症候減退。尿道容積增大。那時候就可以逐漸增加了。

五・注射的方法。先把尿道注射器。吸入藥液。將嘴管厭抵尿道口。防藥液漏出。注射器和尿道須成垂直的方向。否則藥液就不容易進去。藥液既然進去了以後。暫時把外尿道口捺住。再把藥液放去。第二次再同樣的注射一次。這樣的大約施行三次。最後一次把藥液停留到尿道裏面五分或十分間。短些也不妨用手捺住。或用特製之尿道挾子捺住。

六・藥液的溫度。普通多用室溫。但是能夠稍稍加溫。則不但因溫熱對局部有好影響。而且藥液的殺菌力也加高。最好的溫度。是二五至卅度。

七・注射器和消毒。尿道注射時所用的注射器。應當選擇適當的注射器。最合用的。就是用玻璃製造的。嘴管用硬橡皮製造。不但內容易透視。而且消毒也容易。嘴管以圓錐狀的尤爲便利。

尿道注射器應用的時候。先宜消毒。普通大多用五%『來沙而』水消毒。就是將尿道注射器。浸在五%的『來沙而』水裏面。等到用過以後。用水洗淨。依舊放在消毒水裏面。能夠把消毒水每日交換一次最好。

全身病與精蟲缺乏之關係(上)

善繼

夫精蟲缺乏之主要原因，大別之爲三：(甲)產生精蟲器官(睪丸)消失或損壞：(乙)精蟲雖仍能產出，但被阻於經過之道路而不得出(如輸精管因白濁而致閉塞)：(丙)重大全身病，影響及於生殖腺之工作所致。茲篇所述，即指(丙)項而言。

(一)生理的精蟲缺乏：

此種人之精液中，時有精蟲，時無精蟲，大半原因，均以射精次數過多而成。蓋每次射精之間歇時間愈短，則精液之成份愈薄：最後僅爲生殖附屬腺之分泌而已。此事據李哥斯博士（Dr.Liegeois）之報告，某醫學生日射精三四次，連續十日，檢其精液，不見精蟲：但在禁慾三星期後，檢其精液，則精蟲又豐矣。同性質之報告，曾爲加斯培(Casper)及一老年博物學家所檢察，據云交接愈多，則精液愈薄，而精蟲愈缺乏。若連續二日射精之精液而無精蟲，乃經三日之禁慾後射精，則精液中又見多數之精蟲矣；唯精蟲之形較小而數亦少耳。若更休息五日後，則精蟲又豐富增多如前矣。由上二例觀之則知一人雖具有健全之生殖力，但亦可暫時的不能生殖，即無種胎力。職是之故，有多數世人，雖具有完全之生殖力，但力不得嗣，其故每在交接過多，致使精液中之精蟲缺乏，尤以富於情欲之人見之。

生理的精蟲缺乏，普羅納斯氏（Ploennes）曾作動物試驗，以爲證明。彼以電時時刺激一犬脊髓之射精中樞，使有多次之射精，則其精液愈少而愈薄，精蟲亦不見云。

(二)性神經衰弱：

爲神經衰弱之一，亦可視爲上述生理的精蟲缺乏之重性型。原因爲手淫與濫行交接二種。其主要之症狀，即夜中遺精，甚至白日遺精；併有他項神經衰弱症狀及營養障礙等。檢其精液，則精蟲常缺乏減少，並可有精蟲本身之變動，如動作不活潑。生機薄弱而易死亡，胡爾茲門（Ultzmann）曾見蟲尾繞圈，腦門（Neumann）曾見蟲首腫大等。推思其故，蓋以此種人全身營養欠佳，及神經不寧，影響所及，睪丸之營養，及神經節制，亦受障礙，而功用異常，所產之精液，自亦量少而質薄矣。

薄荷葉消散乳腫

葉橘泉

婦人授乳期內。設乳腺閉塞。乳汁凝固。致乳房結腫。掀衝脹痛。往往因而化膿潰爛。中醫舊名爲乳吹。謂由乳兒吹氣入於乳腺。致乳汁凝閉不下所致。又名乳癰。西醫書稱爲化膿性乳腺炎。於紅腫脹痛之初。用薄荷葉擣爛外敷。並用薄荷煎湯內服。能消散退腫。極有效。

橘泉按。薄荷爲唇形科植物。乃中國之特產。係生於田野之宿根草。春季生苗。莖方形。高一二尺。葉卵形而尖。邊緣有淺銳鋸齒。對節生。採其新鮮之葉揉之有辛涼清快之香氣。其主成分爲揮發油。及單寧少許。蓋本品之效用極大。可製薄荷油。及薄荷腦。有行氣袪風通經健胃防腐殺菌鎮痙之功。醫藥上內服外用均具良效。如內服其煎汁。能寬心腹之脹滿。散皮膚之煩熱。且有發汗及通氣之效。而善消乳汁。如乳婦用此內服外敷。則乳消失。小兒離乳時用之最佳。如製成芭布劑用之更便。製法。即用薄荷葉煎濃汁。加小麥粉養成糊。熱敷貼之。

梅毒之害

濟仁

梅毒爲傳染之病。亦爲遺傳之病。常人感染梅毒。或懷悲觀。或抱樂觀。懷悲觀。偶者有不豫。即疑其爲梅毒。或微有寒疾。鼻流涕汁。遽以爲梅毒使然。甚至日以鼻準潰爛爲憂。致成一種精神病。抱樂觀者。以爲梅毒一症。雖稚子亦知之。病勢縱極增劇。亦何致潰爛鼻準。故神色自若。無憂無慮。此二人者。一失之拘謹。一失之怠傲。皆非中庸之道也。夫梅毒非不治之症。於適當之時期。施適當之治療。罹不就愈。若任其自然。不及時而治。後患不堪失想。豈惟鼻準潰爛已哉。必將自戕其生。且嫁禍於其妻孥。更遠而及於其孫。不亦大可畏耶。幸晚近醫學常識。日有進步。人能及早注意。自無罹不測之禍害耳。梅毒之侵襲人體也。與他病不同。不惟皮膚筋肉骨節內臟諸器。皆爲其進攻之戰線。即如頭部之毛髮。手足之指趾尖端。亦無不蒙害。侵鼻則鼻墮。侵目則目盲。侵骨則犯骨病。侵腦與脊髓。則患不可治之精神病。觀梅毒之慘毒如此。喜狹邪遊者曷鑒諸。

幸福書局出版醫藥新書

地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

求孕與避孕　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

腎病研究　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

百病秘方　全書二冊　實售九角　外埠函購寄費一角

保腦新書　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

胎產問題　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

全身病與精蟲缺乏之關係(下)

善繼

(三)梅毒：

茲所述者，爲全身有梅毒傳染，影響及於生殖腺之結果，亦可使精蟲缺乏也。至於以一切睪丸炎或睪丸梅毒腫，而不能產生精蟲者，則係局部症之結果，不在本文範圍，姑不論之。患全身梅毒者，大半有精蟲缺乏，而不能種胎。然亦有不少仍見生活精蟲者；其證明即如有不少康健產婦，每育有先天性梅毒之兒女。由此可知其父親雖有梅毒，仍能有精蟲以種胎也，加斯培（Casper）數載前，曾見一事實，極可證明上說；據云：有一病人，婚後二年不育，檢其妻，則甚健！本人曾有梅毒，其生殖器除一面副睪丸炎外，並無他項變動，則其精液，則無精蟲，乃行梅毒治療，不久精液中即有少數精蟲；復行碘劑治療，精液中精蟲漸增，終至其妻產一有先天性梅毒之小兒。由此觀之，全身梅毒症，在睪丸未有些微之變動時，已有引起精蟲缺乏；但一經治療，便可恢復也。

(四)雅片癮：

久用雅片後，有時亦可引起精蟲缺乏之現象。此事首爲羅蓀泰爾(Rosenthal)注意及之。彼云：有一病人，以頭痛與失眠之故，每日行皮下注射0,5-0,7克嗎啡，後結果發生膀胱麻痺，而在其溺尿末滴同出之白色精液內，發見精蟲結晶。但無精蟲；經長久之治療，即戒除其嗎啡注射後，毒癮一去，睪丸即可如常出產精蟲矣。然多有有癮者，仍能產兒育女，而毫不受些微之影響者。故知雅片之發生精蟲缺乏，殊不一定；大概必達一定程度之毒時，始可有之。

(五)結核症：

肺結核者，有否精蟲缺乏，爭論甚多：普通一般之見解，均以爲肺結核者，反有較多之兒女，反對之者，則云肺結核對於生殖腺，亦有一種損害。故精蟲分泌必受影響。但經各方面之觀察結果，則知事實上適居其中：蓋肺結核者可有缺乏或減少精蟲，但占極少數：大多仍能保持其如常之精液與精蟲也。

精蟲缺乏之診斷：以一滴新鮮之精液置於顯微鏡下觀之即可；若不見精虫，有少數不動之精虫及精虫結晶，均可證明爲精虫缺乏，同時最能得佳良之結果者爲上述之(一)及(二)兩者。

精虫缺乏之治療：治療上，均爲原因治療：如梅毒則行砒礦等之去梅治療；性神經衰弱及交接過多，則行節慾或禁慾及陰萎療法參用之，雅片癮者，則須戒絕雅片等等。

活屋(三十二)

家庭醫藥

(蟄庵譯)

第十一　活屋中之主持家政者

古諺有之曰。男子治外。女子治內。由是觀之。主持一切家政。女子爲不可少之人也。夫一家之中。事雖細小。而洒掃屋宇也。料理食事也。洗滌衣服也。以及指揮婢僕。敎育子女。苟無人主理其事。尙得成爲家乎。故一家之中。不可無主持家政其人焉。我活屋之中亦然。以必要之營養品。供給其維持與生長。與骨以構成骨之必要材料。與肉以組成肉之滋養物質。皆有一人主持其事。否則或供給材料不足。或營養物質不良。則身體必漸次衰弱。而釀成病症。斯掌此重要任務。而處治活屋之家政者。名曰血液。此血液爲紅色。由活潑之左心臟出發。循環全身。以營養品分配於到處組織。而以其排棄無用之物。渡之於肺。由呼吸呼出之。更與名酸素之氣體交換而一旦歸於左心臟。又循環於全身者也。此血液循環之路。名曰血管。又有名動脈者。爲由腸胃所吸收之營養品。與含有肺中渡來酸素之清淨血液之通路也。由此通路而分爲橫路支路。更分爲極細之道路者。名曰毛細管。以營養品與酸素。給於身體之組織。取其不用品。而成爲不潔之血。再返於心臟者。此路名曰靜脈。若血液之循環。其中路或被阻塞。則血液不至之部分。必漸漸腐落。有名脫疽之病症者。讀者諸君想多知之。此因血管因病而血液之循環阻滯。遂由足光漸漸腐敗之狀也。又有名卒中或中風之病者。因行於腦之動脈破裂。血液不能循環而起也。必四十歲後之老人始有犯者。

低能兒之精神衛生

郭人驥

低能兒之程度重者。稱爲白痴。蓋有不能坐立。宛如嬰兒者。有僅具二三歲兒童之智力者。亦有只能交談片言者。其較爲發達者。雖能應對。然完全缺乏熟思考慮之力。尤以對於數目之觀念。向不發達。此謂爲痴愚之重症低能兒。此等人一見雖同常人。然稍加盤詰。即全不明瞭。無論如何敎育。決不能達到普通兒童之智力。智能普通不僅不發達。自其感情行爲之點觀。頗爲不足。易怒。易泣。判斷不良。前後不能分別。知有已而不知有人者爲多。其重者在小學校第一年級。已明知其智力不足。輕者至三年級。始悟其能力低劣者。其較此稍進步者。在入小學之初尚不能明辨。及入高等小學之頃。成績顯然不良。而稱爲魯鈍之質者有之。又此種兒童。感情意志之發育尤爲不良者。其行爲悖德逆理的。所謂不良少年男女，多屬於此種兒童。低能程度已强之白痴者。苟無相當之保護人。因其自己無判別力。而有種種之惡劣行爲者有之。又此種兒童。往往發起發作性興奮。因此而起反社會的行爲者甚多。施行特殊之敎育。殊爲必要。輕度低能兒。須施行特殊(低兒)敎育。蓋不僅其本人。即社會亦蒙其利。精神衛生。對於此種兒童爲其第一要件。反之。而令入普通學校或不入普通學校。則此種兒童多自起悲觀。性情怯懦。益疎學問。更助長其不良性。致起重症精神病者有之。又此種兒童多癲癇。或因其病的關係而爲竊盜放火或猥褻行爲。乃至傷害他人之粗暴行爲者有之。宜在特殊施設之下。加以充分之取締也。蓋有國家救濟之必要。而其前提。宜與普通之兒童早行鑑別。尤爲緊要之舉。

堪以敎育之低能者。務以早應其大分而施行敎育。即功課選其人之易明瞭者。爲之理解。毋過繁重。宜反復敎授。蓋此種人。其腦之忍耐力少。毋使浪費腦力。要以實物敎授爲貴。務須避去暗誦的敎育。顧慮其疲勢。與以充分之休息。又此等兒童。較之普通兒童。更當佳好其榮養。操練其身體。嚴密監視其不好行爲。又此等人之職業選擇。務須適合其人之頭腦。不宜予以馳騖空想困難的工作。因斯人較常人易陷於精神異常。抵抗力減弱。不可不豫防其陷於他種之精神病也。

敬送 專治 夢遺滑精奇方 益腦補腎丸

此方主治一切滑精早洩腦漏陽萎效驗驚人患者函索即寄

燕翼堂

上海西門方斜路寧康里念壹號

便閉之原因與療治法

俞同芳

吾人之大便。以一日通行一次。最爲合度。如數日不通。即覺腹中脹悶。食慾減退。精神困頓。或通而不暢。肛門窘迫。痛苦異常。恒見患者。輒服西藥房中所售之各種通便劑。然有効有不効者。其故何歟。曰藥不對症也。考便閉一症。原因甚多。治法亦異。有因血液枯燥大便不進者。如婦女產後耗血過多。或熱病後胃腸乾燥等。須服五仁。通幽等湯濡血潤腸以通之。若血液燥而氣亦滯。以致氣血結痺。又當於養陰潤燥中。加行氣活血之品。有因肝火太旺。火腐祕結。大便不通者。如睡時太晚。燥作過度等。須用更衣丸苦滑以通之。有因體氣衰弱。無力推送。因而便閉者。須常服獨參湯補益正氣。助其推送之力以通之。有因年老陽衰風閉。大便不通者。須用半硫丸潤以通之。或腑陽不行。用玉壺丹。或陽窒陰凝。清濁混淆。胸痞腹脹。用來復丹。有因溼熱傷氣。阻遏經腑不大通者。則須理肺氣以開降之矣。蓋便閉一症。原因甚多。豈瀉鹽一匙。補丸數粒。所能奏效耶。設惑於西說。而轉用灌腸法。或不幸而空氣注入腸內。其命可立傾。爲害甚大。又有吸嗜雅片者。其腸燥。其糞堅。縱使竭力努掙。奈肛小糞大。終不得出。冷汗淋漓。痛苦更甚。其法可先用蜜煎。或猪膽汁導之。俟糞至肛門。令患者親手以中指染油探入肛門內。將燥糞漸漸挖碎而出。竟有大便一次。燥糞挖作百餘塊而出者。此法輒轉授人。獲效不少。患此症者。幸勿嫌穢而棄之。

他是男女墮落的救星

贈券

憑券附郵十二分卽贈
送「青年之友」一冊

青年之友

空函不覆上海三馬路
雲南路。幸福書局啓

他是青年前途的明燈

青年之友

青年應有的認識……希望青年去做切實工作
青年失業之原因……給前進的青年
青年三大要求……怎樣可免青年的色慾
青年怎樣去做……怎樣指正青年的前途
青年良好習慣……怎樣救濟失學的青年
青年居室問題……怎樣充實自己的能力
青年戀愛的認識……怎樣救濟青年心理病態
青年勿作繭自縛……青年何嘗如夢
青年應負的責任……處世碎錦五十餘則
全書一冊特價祇收大洋二角寄費加一
總發行所上海三馬路雲南路幸福書局

郵票十足通用

脫陽暴亡之研究

——一段新聞——

童亞澄

少壯鰥夫 青春寡婦
樂極生悲 哭亦徒然

寧波人陳長才。年三十三歲。在扈爲成匠。近與謝氏婦人妍識。賃居於周家嘴路三千三百五十二號門牌徐雲先家樓上後廂房。謝氏年方花信。文君新寡。而陳即鰥魚獨居。雄心未已、以故二人情好偸篤。交頸鴛鴦。無宵間斷。前晚（十七）十一時雙雙入房安睡。迨至夜午。春情勃發。不料好興正濃。陳覺情洩不止。繼之以血。及至元陽走盡。而陳之呼吸亦絕。一暝不視。斯眞可謂樂極生悲、該氏見狀。初則驚駭莫名。嗣乃號淘大哭。二房東徐雲先聞聲入室。見陳赤滌滌僵臥於床。而被褥則精血狼籍。詢知就裏。哭笑皆難。即與該氏同投哈同捕房據情報告。由捕頭派探往驗將屍舁赴斐倫路驗屍所，昨晨十一時稟請臨時法院委派葛世勳推事。蒞所驗明陳長才實係生前走陽身死。升坐公位。向陳謝氏質訊一過。諭令該氏具結領屍棺埋。

我讀了以上一段新聞之後。使我好奇心勃發。記得從前常常聽見人說。有個什麼「脫陽死」的怪毛病。然而照醫理上說起來。倘若人把精囊裏的精完全提出。斷不至於立刻身亡（或者此人慢慢底瘦弱下來。而後死亡又作別論）。那麼倒底上面所述的寧波人陳長才。爲什麼交合之後。一流精不止(?)既之以血。一暝不視「一」呢。

①血管系病內。以心臟和大動脈病爲最烈。譬如酒徒。最易得脂肪心病。照病理組織上說。心乃肌肉所成。肌肉中間脂肪極少。而脂肪心病。即肌肉中間。脂肪極多。當然心之工作。比較平常心爲劣。所以這種病人。防不勝防。就是身體用力。大便用勁。食物過飽。神經特別刺戟而興奮等。都可以在幾分鐘內或幾秒鐘內忽然死亡。可和他同樣危險的。似心臟脂肉變性。即梅毒、癆症急性傳染病之後、風濕痛等症。在心肌肉或心瓣膜上得了病根。亦可以由種種原因爆發。而立刻身亡。

②大動脈病。是在年老人。或者中慢性煙酒鉛毒的人。他的動脈能慢性的硬化起來。此種血管。硬如纖絲。若腦血管破裂。即成中風。冠狀動脈破裂。心即停止工作。或血管內含有血塊。將肺大動脈塞牢等。亦可將人忽然由一種特別剌戟而即行身亡。

③腦病。不外乎腦中忽然流血。（除中風已如上述不贅外）其外若腦腫瘍。腦腫。腦壓。可以半時無甚痛苦。而忽然爆發死亡者。腦胞虫入第一及第四腦房。亦可喚起忽然死亡之危。即羊癲發作時而死亡者。亦非罕見之事也。

④呼吸器。最普通是生一種疣於喉頭。倘疣與喉頭。本是嬲得甚緊。疣忽脹大。將喉頭悶住。忽然悶死。且平常頸疣、總有心臟病的居多。

⑤腸器病。腸套病。吐糞病。胃癱。腸嘮。等症而致胃破裂即可得震。

鑑症。而劇然身亡。生人忽然死亡的原因。已略述於右。然而對於陳長才一案。既未得屍身來剖斷。又不能得當時情形詳細報告、祇得照我個人的意見來猜斷一下。陳長才有否以上所述諸病之一。姑不必論。然而他是一個鰥夫。遇了一個寡婦。性慾上當然十分劇烈。交合之際至精洩之時。腦膜同精洩中樞奮興過烈。同時心跳過速。忽然得震㶗症。或可與心臟麻木連合發生而死亡。至於精洩滿末。不外乎精洩麻木中與精洩奮興中樞不復相顧。然精後既之以血。大約精囊受損。血管破裂所致。倘能於該時急救之。用冷水澆於病人之胸背。或以銳利器具刺入腿中刺戟之。則病人必當深呼吸或呼痛。或不至於死亡、海內多名醫。不知我這篇所述的原因錯謨否。請有以敎我來。

疔瘡證治

李遇春

夫疔之一症。由於恣食高粱厚味。或感受不正之氣。以致臟府火毒蘊結經絡膚皮之間。而後發生是瘡。經云。高粱之變。足生大疔。此之謂也。症屬於陽。故其初起。即高腫焮紅。痛癢麻木。頂形如釘。即以此名。其形小。其根深。隨處可生。有朝發而夕死者。有隨發而隨死者。有三五日不死。至一月半月後仍死。亦有毒之輕者。可得自愈。蓋疔瘡一症。治貴乎早。設偶一失治。致毒勢散漫。內攻臟府。則難以爲力矣。然治法亦必須分陰陽臟腑。疔生於唇口手掌。兼見寒熱心煩。神情恍惚等症。此乃心經毒火所成也。紫燕疔生於腰肋筋骨之間。初生便作紫皰。次日破流血水。三日後串筋爛骨。甚則指青舌强。神昏等症。此乃肝經毒火所成也。黃鼓疔生於口角腮顴眼胞上下。發時便作麻癢。見惡心嘔吐等症。此乃脾經毒火所成也。餘如白刃疔。黑靨疔、紅絲疔。等。種種不一。惟見何症。即從何經法之。治疔大法。總不外乎消散清化。寒熱交作者。則先疏解其寒熱。化毒盛者。則重用瀉火解毒之品。即蟾酥丸五味消毒散化疔散等。均可用之。外敷則用蚤休如意蜜糖菊花露調敷。初起瘰硬不消。可用釜墨膏上硃砂散。或酥料亦可。已潰則太乙膏上黃丹。走黃之後。可用立馬回疔丹。凡此皆爲治疔之常法也。

不孕的原因

吳曼青

「不孝有三，無後爲大」。我國人自古來就看重後嗣。我可以大膽的說一句：「中國家庭的悲劇，一大半都是因爲不孕的關係。」因爲我們中國人普遍的觀念，以爲一對夫婦結婚後多年沒有生育，一定是做妻的不能生育。因此「不育的女人」便被輕視，欺侮，甚而至於不能在家庭立足。唉！「不孕」！你是一個使許多中國女子多麼傷心的名詞呵！

我們做婦科醫生的人，天天會遇着許多可憐的女子來求問不孕的診療法。我們當然爲她們詳細診察及解釋。但是我想那些担着「不孕」惡名的不幸女子還多着呢，因此做了這篇「不孕的原因」，使大家明白了解。

我們要曉得，「成孕」是精虫和卵子的結合，是男女雙方的生殖種子的結合。所以男女任何一方面的生殖能力如果不健全，便不能成孕。我們遇見一對結婚多年還沒有生育的夫婦，千萬不能歸罪於一方，必須診察雙方的身體，方可獲得正當的解答。譬如一個男子吧，他生成就是天閹，怎麼可以叫他的妻生育呢？又如一個生過白濁性副睪丸的男子，怎麼可以責備他的妻不能生育呢？其他如患梅毒，糖尿病，脊髓勞，腎臟炎或吸食大量雅片的男子，都可以構成不孕的原因。關於男子方面不孕的原因，恕我在此簡略。好在我不過是要大家曉得一對夫妻無生育，不一定完全是妻的責任罷了。

至於女子方面呢，那不孕的原因也很多。有些女子天生成沒有陰道，或則陰道閉塞一端。這當然沒有生育（俗名石女）。不過，不要把處女膜厚的女子當作不孕的女子。因爲處女膜厚的女子雖則不能和男子性交，但是遺洩在處女膜外的精虫還可以從很小的孔道中穿入子宮內而成孕。有些女子的子宮口天然閉塞，這當然也不能生育。又有些女子，她的生殖器官發育不完全，或則曾經患過子宮內膜炎，或則子宮位置倒後，或則喇叭管曾經發炎而閉塞，或則卵巢曾經發炎，或則曾經患過局部腹膜炎，這些都是可以成爲不孕的原因。此外如患梅毒，糖尿病，腎臟炎，內分泌障碍症，結核性喇叭管炎等症，都可使她不孕。

最可憐的就是女子患白濁病了。大多數的女子患白濁都是她的男人傳染的。起初她不曉得，不過覺得白帶多些罷了。後來白濁菌逐漸向上蔓延，走入子宮腔內，喇叭管內，腹腔內，因此發生子宮內膜炎，喇叭管炎，或局部腹膜炎，結果喇叭管因結蒂組織的增生而愈着，便成爲眞正不孕的喇叭管閉塞症。我們曉得，別的病菌也可以使喇叭管發炎及腹膜局部發炎，可是多少終有痊愈的希望。至於患過白濁性喇叭管閉塞症的女子呢，今生大約沒有生育的希望了。在這許多不孕的女子當中，白濁是件最大的原因。這是多麼可憐的事呵！

至於不孕症的治法，那要從牠的原因方面着手。因爲牠的原因很多，所以治法也沒有一宗。有的要用手術，有的要用喇叭管通氣法，有的要用藥物，有的要用電氣的，有的簡直沒有辦法。好在找着一般正式的專門醫生一定可以獲得相當的療治或解釋。至於那些種子金丹一類的東西呢，我勸大家不要受騙吧。

黃疸之病理及療法

沈友仁

夫黃疸者。爲溼熱遏鬱發蒸。浸淫於內。不能從人身排洩於體外。故成爲黃疸。如傷寒論有云。發熱汗出。此爲熱越。不能發黃。但頭汗出而身無汗。身必發黃。是汗既不得從汗線外泄。小便又不利。更渴飲水漿。則內不得從小便洩出。水飲停留。漫無出路。溼熱在裏。勢必發黃。病理上自熱之作用也。與西說加答兒性黃疸相似。其說爲胃及十二指腸加答兒之波及。輸胆管加答兒性粘膜腫脹。或閉塞或壓迫等之原因。然考其肝與胆之作用。用於人食後。腸胃飽滿。幽門上遏輸胆管。使汁液流入十二指腸。以助消化及防腐、若胆汁缺乏或無。則所下之食物精粗不分。糞色白而不黃矣。由是觀之。知其溼熱閉塞肝胆之內。故障礙輸胆管之分泌。若胆液過多。無出路以排洩。則胆汁迫從肝之小細管。以及肝小葉內之細胆管。受其壓迫腫脹而發炎。終則輸胆管破裂。而入周圍之淋巴管內。遂自血管流入血內。侵浮全身各部。惟結膜皮膚粘膜發黃特甚。尿呈暗褐色。以發汗利水爲法。仲景以茵陳麻黃湯及茵蔯蒿湯主治。蓋麻黃味辛性溫。發太陽之汗。茵陳蒿味苦性寒。專於利水。爲溼熱黃疸要藥。一散一利。甚合於黃疸病也。而茵陳蒿湯亦以茵陳爲主藥。梔子苦寒清胃腸之血熱。屈曲下行。能降火從小便泄去。大黃苦寒。蕩滌腸胃之溼熱。溼熱一去。胆汁自有排泄之路。而黃色自退矣。

幸福書局代售各種良藥

地址 上海三馬路雲南路轉角

遺精散

有夢而遺 無夢而洩 久患新起 服之如神

每盒大洋一元

保腦丸

用腦過度 鼻流濁涕 腥臭異常 一服即愈

每盒大洋五角

白濁丸

白濁初起 溺管刺痛 止濁定痛 效如桴鼓

每盒大洋一元

吐血靈丹

肝火犯肺 肺絡損傷 痰紅吐血 服之立止

每盒大洋五角

獺肝定痛散

女子善鬱 肝病時發 獺肝定痛 靈驗無比

每盒大洋四角

男子淋病自己注射法（下）

謝筠壽

㊅注射的回數。一日中應當注射幾回。這個問題。有許多的學說。有主張愈多愈妙的。也有以爲過於刺戟的。大概急性的時候。每日一二回就夠了。等到急性症候經過了。一日中可以注射四次至六次。

㊆注射的藥液。這是要醫生處方的。讀者如懷疑。吾就將要醫生處方的理由。分述在下面。

甲・藥劑的不同

淋疾注射所用的藥劑。不外乎兩種。一種是殺菌劑。一種是收斂劑。大約高度的時候。用收斂劑。也有兩種彙用的。病人淋菌的多少。非醫生用顯微鏡檢查不可。就是同一的殺菌劑。性質也有強驟的不同。所以要請醫生處方。方才可以應用。

乙・疾病時期的不同

淋菌初期的時候。淋菌繁多。大多是用殺菌藥。等到慢性期。就要用殺菌和收斂彙有的藥劑。淋病後的尿道炎。應當用強力的收斂劑。這時候的斷定。也非醫生不可。

丙・各人體質的不同

同一樣的藥劑。甲用了以後。甚爲適宜。乙用了以後。就覺不適。所以醫生要隨病人各個的個性。加以鑑別後。方才可以處方。

丁・藥液濃度的不同

同一樣的藥劑。濃度應當變化。譬如百分之〇・二五。〇・五。〇・七五。一・〇和一千倍。二千倍五千倍等等。這是要隨各人的體質。淋病的時期。隨時變動。

戊・藥液的變換

照上面所講。有淋菌用殺菌藥。淋菌少用收斂藥。這樣的也甚簡單。但是長時間用同一的藥劑。他的功効。就要減少。必定要變換藥劑。方才可以達到目的。

己・淋病所用的殺菌藥。大多是銀的製劑。銀的製劑。應當施用新鮮的。陳舊的就沒有功効。市上所售的淋病注射藥。從製造的時期上講起來。很可研究。

庚。以上所講的。僅僅是前尿道淋病的一種療法。如過用這個注射方法無効的時候。還要施行其他的灌注法。倘是後尿道淋病的時候。更要施行後尿道注射法。僅僅靠這個前尿道注射法。是一定沒有功效的。

口腔之衞生

尤學周

人之健康。實賴於健全之口腔。口腔之中。能臟各種細菌。如化膿性細菌。倘入血流。有敗血之危。如喉風細菌與肺炎細菌。每每先在口內繁殖。而後攻及臟腑也。病者不潔淨之口中。此項危險細菌。往往早巳繁殖。因口內之抵抗力強。不易爲祟。若因此而忽之。對於口腔之衞生。漫不注意。必引起種種疾病。胃病之發生。亦有以此而致者。

口腔之津液。由舌下之舌下腺。顎下腺。及頰部之耳下腺分泌之混合液也。此中有一種釀酵素。專能消化澱粉質。又能使水分缺乏之食品。及其各種之固形食物。變爲滑柔。使之易於通過食道。麵粉、蛋黃等。雖不必嚼。然不混津液。則不能嚥下。是其證也。口腔發生疾病。分泌不足。津液少。則消化上發生困難。胃病由是而起。

牙齒爲消化機之第一關門。食物經牙齒之咀嚼。則成爲齋粉。而易於消化。如口腔不衞生。則存留其間之殘留食片。由微菌之作用而起腐敗釀酵。生成乳酸。侵蝕牙齒。成爲齲齒。既疼痛不適。又不便於咀嚼。易於造成胃病。蓋咀嚼足以減輕胃部消化上之負擔。且咀嚼之時。則胃液分泌而爲消化上之預備。待食物由口咽下。即可施其消化之力。反之咀嚼不足。消化困難。胃病以起。以免胃病。應注意口腔之衞生。而患胃病也。尤宜深切注意。

名醫大麻金子久醫按（三）

朱振聲錄

吉林參　牡蠣　山藥　扁豆

川貝　橘紅　綿芪用皮白芍

於朮　茯神　訶子　穭根

三診　金土失生。欬逆溏瀉。水火失交。口渴恍惚。陰陽兩傷。自盜汗洩。氣血兩耗。形瘦色奪。左脈關部細弦。右脈寸部小數。兩尺均形柔弱。就脈而論。一派虛象。正合仲訓男子脈大爲勞。極虛亦爲勞。總之。虛久不復爲損。損久不復爲之勞。損及三焦。勞及陰陽。昔賢皆謂不治之症。抑且奉藏者少。奉生者亦少。則陰陽從何維持。勢必至竭蹶之虞。今訂之方。專培其脾。惟治脾者。有一舉而兼三善。一者脾氣旺。如天青日明而龍相潛伏。一者脾氣旺則游溢精氣。而上供於肺。一者脾氣旺而水穀精微。復生其不竭之血也。固斂陰陽。收納腎氣。亦須瞻顧。方呈效服。

吉林參　冬蟲夏草　訶子　芪皮

龍齒　川貝　山藥　坎炁

牡蠣　橘紅　於朮　扁豆